

Cuadro 2: Síntomas hemorrágicos de las deficiencias poco comunes de factores de la coagulación¹

| SÍNTOMA | FACTOR I | FACTOR II | FACTOR V | FACTORS V+VIII | FACTOR VII | FACTOR X | FACTOR XI | FACTOR XIII |
|--|------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Hemorragia nasal (epistaxis) | Común | Común | Común | Ocasional | Común | Común | Común | Común |
| Propensión a los moretones | Común | D. n. d. | Común | Común | Común | Común | Común | Común |
| Periodo menstrual abundante o prolongado | Común | Común | Común | Común | Común | Ocasional | Común | Ocasional |
| Sangre en la orina (hematuria) | Ausente | Poco común | Ausente | Ausente | Poco común | Ocasional | Ausente | Ocasional |
| Hemorragia gastrointestinal (vísceras) | Ocasional | Ocasional | Ocasional | Ausente | Ocasional | Común | Ocasional | Ocasional |
| Hemorragia articular | Común | Común | Poco común | Poco común | Ocasional | Común | Común | Común |
| Hemorragia muscular | Común | Común | Ocasional | Ocasional | Ocasional | Común | Poco común | Ocasional |
| Hemorragia del cordón umbilical | Común | Ocasional | Ausente | Ausente | Poco común | Común | Ausente | Común |
| Hemorragia del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) | Ocasional | Poco común | Poco común | Ausente | Ocasional | Ocasional | Ausente | Común |
| Hemorragia de boca/encías | Común | Común | Común | Común | Común | Común | Ocasional | Común |
| Hemorragia durante el embarazo/parto* | Ausente | D. n. d. | Ausente | Ausente | Ocasional | Ausente ‡ | Ausente | Ausente ‡ |
| Hemorragia durante cirugía mayor*† | Ocasional | Ocasional | Ocasional | Común | Ocasional | Común | Común | Ausente |
| Hemorragia durante cirugía menor† | Común | Ocasional | Ocasional | Común | Común | Común | Común | Común |
| Otros | Poco común | D. n. d. | Poco común | Ocasional | Ausente | Ocasional | Poco común | Ausente |

* El tratamiento no pudo descartarse

† Porcentajes calculados con base en el número de procedimientos

‡ Porcentaje calculado con base en un paciente

LEYENDA Poco común 0-10% de los pacientes Ocasional 10-30% de los pacientes Común >30% de los pacientes Ausente Los pacientes informaron ausencia de este síntoma

ABREVIACIONES D.n.d: dato no disponible

1. Este cuadro se compiló exclusivamente con información de la base de datos internacional sobre trastornos de la coagulación poco comunes (www.rbdd.org) y no es exhaustivo. Otros síntomas reportados en la literatura se han incluido en el texto. No se dispone de información sobre la deficiencia combinada de factores de la coagulación dependientes de la vitamina K.